# PRATICLIP®

**Fixation pour sonde naso-gastrique de Ø 4mm - CH.12 sans usage de ruban adhésif.**

Nous vous invitons à lire attentivement cette Notice - Mode d'Emploi et à consulter notre site de vente en ligne qui vous fera gagner un temps précieux

**http://www.praticlip.com**

CE

## NOTICE • MODE D'EMPLOI

**La bague fendue PRATICLIP®**, fixation pour sonde naso-gastrique, est un dispositif médical de nouvelle génération, qui présente une totale innocuité, parfaitement adapté aux soins en établissement hospitalier, ainsi qu'aux impératifs de sécurité et de confort du patient qu'exigent la chirurgie et la médecine ambulatoire.

**La fixation pour sonde naso-gastrique PRATICLIP®** est réservée aux sondes CHARRIERE 12 (Ø extérieur 4 mm) en silicone ou polyuréthane. C'est un DM - dispositif médical - de classe I , non invasif, non stérile à usage long terme (jusqu'à 90 jours), le dispositif est livré en sachet individuel soudé, à ouverture pelable (simple écartement des deux faces) ou avec encoche pour arrachage aisé. **PRATICLIP®** fait fabriquer ses tresses 100% coton et le dispositif en polypropylène en AUVERGNE (établissement bénéficiant de la Certification ISO 9001 /2008).

Ses services de commercialisation et d' expédition sont implantés en Rhône-Alpes. **PRATICLIP®** dispose de la certification CE.

La Sasu PRATICLIP est Concessionnaire Exclusif pour l'ensemble de la Communauté Économique Européenne et diffuse **la bague fendue PRATICLIP®** sous licence.

**PRATICLIP®** met tout en œuvre pour procurer le maximum de confort au patient et valoriser le travail des personnels soignants, en renforçant certains paramètres de sécurité dans la lutte contre les infections microbiennes.

**Plus de fil repère logé dans la narine.**




**Suppression du ruban adhésif**




Après contrôle de bon positionnement de la sonde, faire un trait repère sur la sonde au feutre indélébile.




Pour loger la bague fendue PRATICLIP®, tirer la sonde sur environ 3 cm et pincer les parois de celle-ci à environ 2 cm en retrait du repère.

Présenter la fixation sous l'angle qui vous convient le mieux. Préalablement, une minuscule goutte d'antiseptique/désinfectant incolore, déposée dans la gorge de la bague facilitera l'ajustement final (facultatif).




Une légère inclinaison de la bague fendue facilitera davantage sa mise en place.




Fixation bague bien positionnée, à la limite du trait repère haut. Faire ensuite le trait repère 2 à l'aide du feutre indélébile.




Maintient de la sonde à sa bonne position par l'attache de la fixation derrière la tête, passage de la tresse en coton par le dessus de l'une des oreilles.

Autre partie de la tresse passant sous l'autre oreille.

Patient adulte: avant de nouer la tresse par un double nœud finissant en boucles ou autre méthode, contrôler que la tension de la tresse offre une petite souplesse. Il faut pouvoir loger au moins deux doigts fins entre la tresse et le crâne.

Patient enfant en bas âge ou turbulent : tendre un peu plus la tresse et ne pas finir le nœud double, en boucles. Couper les surplus de tresse qui dépasse du double nœud, à ras de celui-ci.

Présentation sonde + fixation au stade de la nutrition.

Présentation sonde + fixation au stade de la non alimentation, au repos.

Une sonde fixée avec la bague fendue PRATICLIP® permet au patient de se prodiguer les soins de toilette du visage qui lui conviennent (rasage...).

### Conseils de mise en place observés dans la pratique

Pour faciliter au maximum le logement de la sonde dans **la bague fendue PRATICLIP®** et sa fixation, nous vous conseillons de procéder préalablement au lavage minutieux de vos mains suivi d'une légère friction de celles-ci avec un aseptisant - désinfectant incolore (quelques gouttes suffisent). Avec l'habitude, le temps nécessaire pour effectuer repères + union sonde-fixation + attache tresse est de **moins de 20 secondes.**

**Nota :** Si la chevelure du patient est dense et longue, passer la tresse sous les cheveux, au plus près du crâne. Pour régler le serrage de la tresse, ne laisser passer entre celle-ci et le crâne que deux doigts fins au maximum.
Si le patient est chauve ou cheveux très courts, pour régler le serrage de la tresse ne laisser passer entre celle-ci et le crâne que deux à trois doigts fins, moins si le patient préfère une tresse bien tendue.
L'avantage de procéder avec une méthode double nœud finissant en boucles est de permettre de réajuster le serrage en cours de traitement si le besoin s'en ressent.

© PRATICLIP - Reproduction interdite

## Références produit

### Conditionnements hospitaliers

Idéalement par carton de 150, 250, 500 pièces
+ 1 notice mode d'emploi par lot de 25 pièces.
Réf. : CH12EXT4MM-LGB
Lot 130863

3770000 981001

### Conditionnements adaptés aux petites unités de soins à domicile

Idéalement par boîte de 25, 50, 75, 100 pièces
+ 1 notice mode d'emploi par lot de 25 pièces.
Réf. : CH12EXT4MM-LGB
Lot 130863

3770000 981018

## Date de réalisation de la notice

Décembre 2013

La fixation PRATICLIP® ayant une durée de vie identique à celle de la sonde mise en place, permet parfaitement au patient de vaquer à la totalité de ses besoins d'hygiène corporel sans dépose de celle-ci, en toute sécurité (douche...). La tresse 100% coton ayant subi au préalable un traitement de rétrécissement, sèche très rapidement sans variation de sa longueur.

## Site internet

http://www.praticlip.com




Plans non contractuels, dimensions indiquées en mm, susceptibles d'être réduites au fur et à mesure des progrès techniques qui seront faits en matière de surmoulage.

© PRATICLIP - Reproduction interdite - © PRATICLIP Reproduction interdite -

**PRATICLIP®** • **sasu au capital de 30 000 €** • **33, rue de la gare** • **42440 Noirétable** • **France** • **Tél. : +33 (0)4 77 24 20 90** • **E-mail : contact@praticlip.com**

SIRET 793 675 869 00010 • NAF 4646Z • RCS Saint-Etienne 793 675 869 - Fichier informatique, autorisation CNIL N° 1686310 v 0

*Les idées de Sandrine • SIRET 539 038 323 000 17 • Copyright - Tous droits réservés • Mars 2014*